

Medicamenti di base: sintesi delle caratteristiche

Parziale revisione: 20.12.2018

Medicamenti sintetici					
Medicamento	Tempo di azione	Dosaggio	Gravidanza consentita	Tendenza alle infezioni	Effetti collaterali
Arava® (leflunomide)	4-6 settimane	10-20 mg al dì	no	leggermente accresciuta	diarrea, leggera caduta di capelli, epatiti o polmoniti rare, soppressione dell'ematopoesi, pressione alta
CellCept® (micofenolato mofetile) e Myfortic® (micofenolato)	1-4 settimane	500-1500 mg al dì	no	leggermente accresciuta	disturbi gastrintestinali, frequenti infezioni
Endoxan® (ciclofosfamide)	1-4 settimane	50-150 mg al dì	no	fortemente accresciuta	disturbi gastrintestinali, soppressione dell'ematopoesi, perdita di capelli, cistite, infezioni frequenti, sterilità
Imurek® (azatioprina)	2-3 mesi	50-150 mg al dì	sì	leggermente accresciuta	leggera nausea, disturbi gastrintestinali, soppressione dell'ematopoesi, epatite
Metoject®, Methrexx® (metotressato)	6-8 settimane	7,5-30 mg alla settimana	no	leggermente accresciuta	disturbi gastrintestinali, alterazioni della cute e delle mucose, leggera caduta di capelli, epatiti o polmoniti rare, soppressione dell'ematopoesi
Otezla® (apremilast)	2-3 mesi	60 mg al dì	no	leggermente accresciuta	diarrea, nausea, disturbi dell'apparato digerente
Plaquenil® (idrossiclorochina)	3-4 mesi	200-400 mg al dì	sì	no	fotosensibilità della cute e degli occhi, molto raramente danni alla retina dell'occhio
Salazopyrin® EN (sulfasalazina)	2-3 mesi	2000-3000 mg al dì	sì	no	disturbi gastrintestinali, allergie della pelle, alterazioni dell'ematopoesi, nausea, mal di testa, dolori alla farine, febbre
Sandimmun® (ciclosporina A)	1-3 mesi	100-300 mg al dì	sì	leggermente accresciuta	disturbi gastrintestinali, pelosità accresciuta, gonfiore alle gengive, pressione alta, disturbi delle funzioni renali
Xeljanz® (tofacitinib)	1-2 mesi	10-20 mg al dì	no	accresciuta	mal di testa, diarrea, epatite, soppressione dell'ematopoesi, infezioni frequenti

Medicamenti prodotti con biotecnologie (farmaci biologici)					
Medicamento	Tempo di azione	Dosaggio	Gravidanza consentita	Tendenza alle infezioni	Effetti collaterali
Actemra® (tocilizumab)	poche settimane	infusioni ogni 4 settimane o iniezione da 162 mg 1 volta alla settimana	no	accresciuta	rare reazioni all'infusione simili a un'allergia (arrossamento della pelle, senso di costrizione al petto e difficoltà di respiro)
Benlysta® (belimumab)	3-6 mesi	infusioni ogni 4 settimane, più spesso all'inizio	no	accresciuta	rare reazioni all'infusione, soppressione della formazione dei globuli bianchi, infezioni
Cosentyx® (secukinumab)	1-3 mesi	150-300 mg la settimana per 4 settimane tramite iniezioni sottocutanee; successivamente ogni 4 settimane	no	accresciuta	reazioni cutanee nel punto dell'iniezione, infezioni frequenti
MabThera® (rituximab)	1-3 mesi	2 infusioni da 1000 mg	no	accresciuta	rare reazioni all'infusione simili a un'allergia (arrossamento della pelle, senso di costrizione al petto e difficoltà di respiro)
Orencia® (abatacept)	poche settimane	infusioni ogni 4 settimane, più spesso all'inizio oppure iniezione sottocutanea 1 volta alla settimana	no	accresciuta	rare reazioni all'infusione simili a un'allergia (arrossamento della pelle, senso di costrizione al petto e difficoltà di respiro)
Stelara® (ustekinumab)	1-2 mesi	45 mg ogni tre mesi, seconda iniezione già dopo un mese	no	accresciuta	reazioni cutanee nel punto dell'iniezione, infezioni frequenti
Inhibiteur du TNF: Cimzia® (certolizumab)	da pochi giorni a poche settimane	200 mg ogni 2 settimane oppure 400 mg ogni 4 settimane, dose maggiore all'inizio	sì	accresciuta	reazioni cutanee nel punto dell'iniezione, infezioni frequenti

Inhibiteur du TNF: Enbrel® (etanercept)	da pochi giorni a poche settimane	50 mg 1 volta alla settimana	no	accresciuta	reazioni cutanee nel punto dell'iniezione, infezioni frequenti
Inhibiteur du TNF: Humira® (adalimumab)	da pochi giorni a poche settimane	40 mg ogni 2 settimane	no	accresciuta	reazioni cutanee nel punto dell'iniezione, infezioni frequenti
Inhibiteur du TNF: Remicade® (infliximab)	da pochi giorni a poche settimane	infusione ogni 6-8 settimane, all'inizio più frequentemente	no	accresciuta	rare reazioni all'infusione simili a un'allergia (arrossamento della pelle, senso di costrizione al petto e difficoltà di respiro); infezioni frequenti
Inhibiteur du TNF: Simponi® (golimumab)	da pochi giorni a poche settimane	50 mg 1 volta al mese	no	accresciuta	reazioni cutanee nel punto dell'iniezione, infezioni frequenti

→ **Nota:** le liste dei medicamenti riportate nel presente opuscolo non mirano a essere esaustive. Esse vengono aggiornate periodicamente. Le nuove versioni sono disponibili online all'indirizzo: www.reumatismo.ch/medicamenti