



Rheumaliga Schweiz
Ligue suisse contre le rhumatisme
Lega svizzera contro il reumatismo

Auswertung der Umfrage zur Diagnose bei entzündlichem Rheuma

Die Rheumaliga Schweiz dankt den insgesamt **392** Personen, die zwischen dem 12. September 2016 und dem 31. Januar 2017 an der Umfrage teilgenommen haben. Aufgeteilt nach Sprachregionen, zählte die Umfrage 273 deutschsprachige, 107 französischsprachige und 12 italienischsprachige Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

84% aller Teilnehmer gaben das Geschlecht als weiblich an, 16% männlich. Das Alter der Teilnehmer betrug nach eigenen Angaben im Durchschnitt 49,9 Jahre.

Bei den Krankheitsbildern zeigte sich folgende Verteilung:

- 144 Teilnehmende mit rheumatoider Arthritis (RA)
- 119 Teilnehmende mit Morbus Bechterew
- 32 Teilnehmende mit Psoriasis-Arthritis (PsA)
- 10 Teilnehmende mit Juveniler Idiopathischer Arthritis (JIA)
- 87 Teilnehmende mit anderen rheumatischen Erkrankungen

Die Zeit vom ersten Arztbesuch bis zur Diagnose betrug:

- bei 43% weniger als 6 Monate
- bei 11% 6 bis 12 Monate
- bei 4% 12 bis 18 Monate
- bei 5% 18 bis 24 Monate
- bei 38% mehr als 24 Monate

Sie finden die Auswertung der Umfrage auf den folgenden sechs Seiten in Form von Grafiken.



Rheumaliga Schweiz
Ligue suisse contre le rhumatisme
Lega svizzera contro il reumatismo


Auswertung nach Krankheitsbild




Geschlecht der Teilnehmenden




Alter der Teilnehmenden



Wer hat die Diagnose gestellt?




Zeit vom ersten Arztbesuch bis zur Diagnose





Rheumaliga Schweiz
Ligue suisse contre le rhumatisme
Lega svizzera contro il reumatismo


Auswertung nach Krankheitsbild




Geschlecht der Teilnehmenden




Alter der Teilnehmenden



Wer hat die Diagnose gestellt?



Zeit vom ersten Arztbesuch bis zur Diagnose





Rheumaliga Schweiz
Ligue suisse contre le rhumatisme
Lega svizzera contro il reumatismo


Auswertung nach Krankheitsbild

alle Rheumatoide Arthritis Morbus Bechterew Psoriasis-Arthritis
Juvenile idiopathische Arthritis (JIA) andere


Geschlecht der Teilnehmenden

75% 25%


Alter der Teilnehmenden



Wer hat die Diagnose gestellt?




Zeit vom ersten Arztbesuch bis zur Diagnose





Rheumaliga Schweiz
Ligue suisse contre le rhumatisme
Lega svizzera contro il reumatismo


Auswertung nach Krankheitsbild




Geschlecht der Teilnehmenden




Alter der Teilnehmenden



Wer hat die Diagnose gestellt?




Zeit vom ersten Arztbesuch bis zur Diagnose





Rheumaliga Schweiz
Ligue suisse contre le rhumatisme
Lega svizzera contro il reumatismo


Auswertung nach Krankheitsbild




Geschlecht der Teilnehmenden




Alter der Teilnehmenden



Wer hat die Diagnose gestellt?



Zeit vom ersten Arztbesuch bis zur Diagnose





Rheumaliga Schweiz
Ligue suisse contre le rhumatisme
Lega svizzera contro il reumatismo


Auswertung nach Krankheitsbild




Geschlecht der Teilnehmenden



Alter der Teilnehmenden



Wer hat die Diagnose gestellt?



Zeit vom ersten Arztbesuch bis zur Diagnose

