FIBROMYALGIE & LOKALE WEICHTEILSCHMERZEN

ABGRENZUNG IN DER HAUSARZTPRAXIS

Update Rheumatologie 2021

INHALT

1. Nomenklatur
2. Fibromyalgie-Syndrom
3. Lokale Weichteilprobleme

NOMENKLATUR

Die zur Beschreibung von Weichteilschmerzen des Bewegungsapparates gebrauchten Begriffe sind nicht alle eindeutig definiert und werden gelegentlich etwas willkürlich verwendet.

«WEICHTEILRHEUMATISMUS»

Darunter werden i.d.R. Schmerzen am Bewegungsapparat verstanden, welche sich regional oder generalisiert manifestieren. Diesen können degenerative, entzündliche, sowie rein funktionelle Veränderungen von Sehnen, Sehnenansätzen, Sehnenscheiden, Bändern, Schleimbeuteln, Muskeln, Binde- sowie Fettgewebe zugrunde liegen.

Da der Begriff ungenau ist und das falsche Engramm einer chronischen Erkrankung setzen kann, sollte er von Ärzten besser NICHT verwendet werden.

MYOFASZIALE SCHMERZEN

Bezeichnung von lokalen oder regionalen Muskel-/Faszien-/Sehnenschmerzen. Sie werden klinisch durch das Vorhandensein von Druckdolenzen charakterisiert, z.B. bei Über-/Fehlbelastungen oder als sekundäre Problematik durch Verspannungen mehrerer Muskeln oder Muskelgruppen. Sie beinhalten meistens Triggerpunkte.

TRIGGERPUNKTE

Verwandter Begriff für MYOGELOSEN. Triggerpunkte sind hochgradig (druck)schmerzhafte Punkte im Muskel, mit häufig unspezifischer, aber für den jeweiligen Triggerpunkt charakteristischer Ausstrahlung – teils auch ohne Ausstrahlung. Histologisch möglicherweise einer dauerhaften Kontraktur von Sarkomeren entsprechend und palpatorisch für Geübte als winziger Knoten/Stränge wahrnehmbar.

PERIARTHROPATHIE

Um das knöcherne Gelenk herum lokalisierte Schmerzen ohne genaue Zuordnung. Ursächlich in Frage kommen alle dem Gelenk anliegenden/ansetzenden Strukturen, also Muskel-/Kapsel-/Band-/Sehnen- oder Schleimbeutel-Probleme.

MYOTENDINOSE

Meist zur Beschreibung eines Reiz- und/oder Verspannungszustandes am *Sehnen-Muskelübergang* gebrauchter Begriff.

TENDINOSE

Degenerativ bedingte (Synonym: TENDINOPATHIE) oder durch *Über-/Fehlbelastung* ausgelöste Schmerzen in der Sehne.

TENDINITIS

Entzündung der Sehne. z.B. bei Kalkentzündung als «Tendinitis calcarea».

INSERTIONS-TENDINOSE

Synonym: ENTHESIOPATHIE

Mechanisch bedingte Reizung/Degeneration am Knochen-/Sehnenübergang.

ENTHESITIS

Synonym: INSERTIONS-TENDINITIS

Entzündung am Knochen-/Sehnenübergang.

TENOVAGINITIS

Entzündung der Sehnenscheide.

BURSITIS

Entzündung des Schleimbeutels.

LOKALE UND GENERALISIERTE WEICHTEILSCHMERZEN

FIBROMYALGIE-SYNDROM – GENERALISIERTE WEICHTEILSCHMERZEN

SCHMERZVERARBEITUNG BEI FIBROMYALGIE

Desmeules JA et al., Arthritis Rheum 2003, 48:1420-9

CHRONISCHES NICHT-TUMORBEDINGTES SCHMERZSYNDROM

Gewebeschädigung
(nozizeptiv)

Nervenschädigung
(neuropathisch)

Stress-induzierte Hyperalgesie
(SIH)

→Fibromyalgie-Syndrom
→ Angsterkrankung bzw.
→ Perfektionismus mit
muskulären Verspannungen

- Hohe Überlappung zwischen **Schmerz- und Stressverarbeitung** auf den verschiedenen Ebenen des limbischen Systems (neuronal, hormonell)
- Vorausgegangene Prägungen (perzeptuelles Gedächtnis) bedingen **Erwartungshaltung** bei der Reizverarbeitung (AMY, aINS, ACC)

NEUROBIOLOGISCHE MECHANISMEN DER STRESSVERARBEITUNG

ÜBERLAPPUNG ZWISCHEN SYSTEMISCHEN SYNDROMEN

The Journal of Rheumatology 2003

Editorial

Stop Using the American College of Rheumatology Criteria in the Clinic

FREDERICK WOLFE, MD,
National Data Bank for Rheumatic Diseases,
Arthritis Research Center Foundation,
1035 N. Emporia, Suite 230,
Wichita, Kansas 67214, USA.

„... by ignoring the **central psychosocial and distress features** of the syndrome ... and choosing instead a physical examination item, we allowed FM to be seen as mostly a physical illness.“

FIBROMYALGIE-SYNDROM

NEUE DIAGNOSEKRITERIEN (2011, REVIDIERT 2016)

Widespread Pain Index (WPI: 0 – 19)

- multilokulärer Schmerz (ohne Druckdolenz!) in 19 Körperbereichen

Symptom Severity Score (SSS: 0 – 12)

- Fatigue (Ausprägung 0 – 3)
- nicht-erholsamer Schlaf (0 – 3)
- kognitive Einschränkungen (0 – 3) -> „fibro-fog“
- Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Depression (0–3)

Ein Fibromyalgie-Syndrom ist zu diagnostizieren, wenn **alle 3 Punkte** erfüllt sind:

- **WPI 7 Punkte und SSS 5 Punkte, oder WPI 4–6 Punkte und SSS 9 Punkte**
- **Schmerz in 4 von 5 Körperregionen**
(4 Körper-Quadranten plus 1 für Wirbelsäule)
- **Symptome seit mind. 3 Monaten persistent**
- **Andere Ursache unwahrscheinlich**

ANAMNESE

- Chronische generalisierte Schmerzen (vgl. vorhergehende Folie: neue Diagnosekriterien 2011, revidiert 2016)
- Müdigkeit, Abgeschlagenheit, rasche Erschöpfbarkeit
- Schlafstörung
- Angstsymptome
- Weitere Begleitsymptome wie Steifigkeits- und Schwellungsgefühl, Sicca-Symptomatik, Parästhesien, Restless Legs, Raynaud-ähnliche Symptome, Kopfschmerzen, temporomandibuläre Dysfunktion, Reizdarm und Reizblase
- Psychiatrische und psychosoziale Anamnese (z.B. Kindheitstraumata)

KLINISCHER UNTERSUCH

- Klinische Untersuchung unabdingbar, um fibromyalgietypische Berührungsdolenzien von echten myofaszialen Schmerzen abzugrenzen (z.B. Triggerpunkte).

IN DER PRAXIS

- In der Praxis ist die Anwendung der angepassten ACR-Kriterien 2016 an Stelle der alten Tenderpoints empfohlen.
- Der Begriff des Fibromyalgie-Syndroms muss vorsichtig verwendet werden bei Versicherungen.

IN DER PRAXIS

- Möglicherweise hilfreicherer Konzept der „Fibromyalginess“
- Demnach wäre die Diagnose einer Fibromyalgie nicht ein Ja oder Nein, sondern eine Bandbreite mit mehr oder weniger ausgeprägter „Fibromyalginess“.
- Je ausgeprägter also die „Fibromyalginess“ (je mehr Fibromyalgie-typische Symptome vorliegen; rev. ACR 2016-Score), desto eher besteht ein zentraler Schmerzanteil und desto unwirksamer ist eine rein somatische Analgesie.

BEGLEITSYMPTOME

(SIEHE AUCH REVIDIERTE ACR-KRITERIEN 2016)

- Muskelkrämpfe
- Muskelschwäche
- Muskelermüdung
- Gelenkschmerzen
- Morgensteifigkeit
- Diffuse Sensibilitätsstörungen
- Schwellungsgefühl Hände und Füße
- Raynaud-ähnliche Symptome
- Kopfschmerzen
- Schlafstörung
- Müdigkeit
- Kognitive Störungen
- Thorakales Engegefühl
- Reizdarmsymptome
- Harndrang
- trockener Mund
- subfebrile Temperaturen
- Polyallergie

LABOR

Bei der idiopathischen Form unauffällig. Laboruntersuchungen zum Ausschluss von Differentialdiagnosen gerechtfertigt.

Beispiel Routinelabor:

- BSR/CRP
- Blutbild
- TSH
- CK

BILDGEBUNG

Primär keine Bildgebung.

Wenn, dann nur zum Ausschluss von Differentialdiagnosen.

DIFFERENTIALDIAGNOSE/ ÜBERLAPPENDE KRANKHEITSBILDER

Somatisch:

- Infektiös (z.B. Hepatitis C, andere virale Infekte)
- Entzündlich-rheumatische Systemerkrankungen
- Endokrinopathien
- Knochenstoffwechselstörungen
- Neoplasien
- Medikamente (z.B. Statine)
- Andere (z.B. Hypermobilitätssyndrom)

Psychiatrische Störung mit Leitsymptom Schmerz, wie z.B.

- Somatisierungsstörung («bodily distress disorder»)
- generalisierte Angststörung
- soziale Ängste
- gesundheitsbezogene Ängste
- Perfektionismus als Persönlichkeitsstil
- posttraumatische Belastungsstörung

BEHANDLUNG

Drei Möglichkeiten:

1. Trainings- und Physiotherapie
2. Psychologische/psychosomatische Therapie
3. Medikamente: geringer Stellenwert, v.a. zur Behandlung der Begleitsymptome

BEHANDLUNG

Trainings- und Physiotherapie

- Etablierung regelmässiger Ausdaueraktivitäten:
Aerobes Training → 3-4x/Woche, Puls < 120
- Training zur Verbesserung beeinträchtigter Körperfunktionen
- Erlernen/Erfahren, dass trotz Schmerzen bewegt und gearbeitet werden kann – funktionelle Zielsetzung
 - Frequenz vor Dauer vor Intensität steigern
- Information bzw. Schulung im Umgang mit den Schmerzen
- Absprache zwischen behandelndem Arzt <> Physiotherapeut*in

BEHANDLUNG

Psychologische/psychosomatische Therapie

- Aufklärung und Information über die Krankheit
- Angehen von psycho-sozialen Cofaktoren, Stressreduktion
- Erlernen und regelmässiges Ausüben von Entspannungstechniken, z.B. autogenes Training
- Erlernen von kognitiven, verhaltenstherapeutischen Techniken („Bewegen und Funktionieren im Alltag trotz Schmerz“)
- Regelmässige Gespräche
- Zuhören bei Auftreten von (neuen) Symptomen und richtiges Verhalten derselben

BEHANDLUNG

Medikamente

Medikamente haben in der Behandlung des Fibromyalgie-Syndroms nur einen sehr geringen Stellenwert!

- Kurzzeitiger (≤ 14 Tage) Einsatz von Schmerzmitteln (**keine potenten Opioid!**) bei Schmerzschüben.
- Langzeitiger Einsatz von schmerzmodulierenden Substanzen (z.B. Antidepressiva); **keine Opioid**
- **Keine Steroide**

SCHMERZMODULIERENDE SUBSTANZEN

Zurückhaltend einsetzen!

Trizyklika	Amitriptylin (Saroten®)	Initial 10–20 mg abends, bei schlechtem Ansprechen bis 50 mg/d	Mit Studien gut belegte Wirkung: - Schmerzreduktion - Abnahme der Tender points - Verbesserung der Schlafqualität
	Trimipramin (Surmontil®)	Bis 50 mg abends (kann auch mit Tropfen aufdosiert werden)	
SSRI	Fluoxetin (Fluctine®)	20–40 mg morgens	Wirkung allein eher gering Fluoxetin manchmal gut wirkend in Kombination mit Amitriptylin
	Citalopram (Seropram®)	20–40 mg morgens (kann auch mit Tropfen aufdosiert werden)	
SNRI	Duloxetin (Cymbalta®)	60–120mg morgens	Hohe Dosis nötig (noradrenerge Wirkung)
	Venlafaxin (Efexor®)	75–225mg morgens	
Antiepilep- tikum	Pregabalin (Lyrica®)	25–600mg (abends beginnen)	Zulassung für neuropathische Schmerzen

GEZIELTE BEHANDLUNG DER BEGLEITSYMPTOME

- Schlafstörung (z.B. sedierendes Antidepressivum)
- Migräne (z.B. Triptane)
- Colon irritabile (z.B. Constella®, Iberogast®)
- Restless Legs (Dopaminagonisten)

AUSWAHL LOKALER WEICHTEILPROBLEME

«TENDOVAGINITIS DE QUERVAIN»

- Diagnose: Druckdolenz
Finkelstein-Test
(im Seitenvergleich)
- Therapie: Ruhigstellung, Kühlen
NSAR (top./syst.)
Physio-/Handergotherapie
peritendinöse Steroidinfiltration
(Operation)

gesundheitsinformation.de

«TENNIS-ELLBOGEN»

SYNONYM: EPICONDYLOPATHIA HUMERO-RADIALIS

- Diagnose: Druckdolenz
Schmerz-Verstärkung durch resistive HG/Finger-Extension
- Differentialdiagnose: Supinator-Syndrom (Irritation des R. prof. N. radialis)
- Therapie: Vermeiden provozierender Belastungen
Dehnübungen; Ergo-/Physiotherapie
lokal NSAR
Stosswellen-Therapie; PRP-Infiltration
Entzündungsbestrahlung
Möglichst keine Steroid-Infiltrationen
(Selten Evaluation einer Operation)

«SUPINATOR-SYNDROM»

- Diagnose: Schwäche Extensoren Dig IV/V & Handgelenk, (Schmerz)
Neurographie, MRI
- Therapie: Vermeiden provozierender Bewegungen
Dehnübungen; Ergotherapie
Operation (Dekompression)

«PHS SIMPLEX»

SYNONYM: SUBACROMIALES IMPINGEMENT

- Diagnose: Painful arc; Spezifische Tests (z.B. Hawkins, Neer)
Sonografie, Röntgen, (Arthro-MRI)
- Differentialdiagnose: Frozen shoulder; Rotatorenmanschettenläsion;
Bursitis subacromialis; (AC-G-Arthrose; Bicepspathologie)
- Therapie: Physiotherapie
Subacromiale Steroidinfiltration
(Operation)

«PHS ANKYLOSANS»

SYNONYM: ADHÄSIVE/RETRAKTILE CAPSULITIS („FROZEN SHOULDER“)

- Diagnose: aktive und passive Bew.-Einschränkung in alle Richtungen (v.a. auch bei **Aussen/(Innen)rotation**)

Sonografie, Röntgen inkl. Thorax, (Arthro-MRI), nüchtern BZ (Ausschluss RM-/Labrum-Läsion, Pancoast-Tumor, Diabetes mellitus)
- Differentialdiagnose: Impingement, Tendinitis calcarea, RM-Läsion
- Therapie: früh: intraartikuläre glenohumerale Steroidinfiltration
intensive Physiotherapie
(Sehr selten: arthroskop. Adhäsioolyse)

«PHS CALCAREA»

Synonyme: - mechanisch: Rotatorenmanschetten-Verkalkung
- entzündlich: Tendinitis calcarea

- Diagnose: Positiver Impingement-Tests (Hawkin)
Röntgen, Sonografie
- Differentialdiagnose: Funktionelles Impingement;
RM-Läsion; Bicepssehnenpathologie
- Therapie: Physiotherapie (Zentrierung/Dekoaptation)
Needling/Subacromiale Steroidinfiltration
Stosswellen-Therapie
Operation

Humerus

«PHS CALCAREA»

Synonyme: - mechanisch: Rotatorenmanschetten-Verkalkung
- entzündlich: Tendinitis calcarea

- Diagnose: Positiver Impingement-Tests (Hawkin)
Röntgen, Sonografie
- Differentialdiagnose: Funktionelles Impingement; RM-Läsion;
Bicepssehnenpathologie
- Therapie: Physiotherapie (Zentrierung/Dekoaptation)
Needling/Subacromiale Steroidinfiltration
Stosswellen-Therapie
Operation

«PHS CALCAREA ACUTA»

Synonyme: - mechanisch: Rotatorenmanschetten-Verkalkung
- entzündlich: **Tendinitis calcarea**

- Diagnose: Heftiger Ruhe-/Nachtschmerz
Röntgen, Sonografie
- Differentialdiagnose: Plexusneuritis; RM-Ruptur; Arthritis; Infekt
- Therapie: Kühlen
system. NSAR
Subacromiale Steroidinfiltration
Physiotherapie
(ev. später Needling à froid)

«PHS TENDOPATHICA» SYNONYM: ROTATORENMANSCHETTENRUPTUR

- Diagnose: bei Jungen Trauma, bei Älteren degenerativ

Bewegungs-Schwäche/ev. –Ausfall
(spezielle Tests: Jobe-, Lift-off-,
Belly-press-test, u.a.)

(Röntgen), Sonografie, Arthro-MRI

- Therapie: Physiotherapie

(ev. Steroidinfiltration)

Orthopädisches Konsil (Operation)

«FERSENSPORN»

Ätiologie: Plantarfasziitis versus Plantare Enthesiopathie

- Diagnose: Belastungs-/Anlaufschmerz
- Differentialdiagnose: Calcaneus-Fx, Fremdkörper, Tarsaltunnel-Syndrom / Spondyloarthritiden
- Therapie: Korrektur einer ev. Fehlstatik
Polsterung (Silikon-Einlage, weiche Schuhe)
Physiotherapie (Dehnung, Kräftigung der Fussstabilisierenden Muskulatur)
Stosswellen-Therapie
Entzündungsbestrahlung
Hyaluronsäure-/PRP-Infiltration
Laufanalyse, -info
Möglichst keine Steroid-Infiltrationen

«ACHILLODYNIE»

Ätiologie: Achilles-Tendinose versus Achilles-Enthesitis

- Diagnose: Tendinose: Ddo im mittleren Drittel; Auftreibung
Enthesitis: Ddo am Knochenansatz
- Differentialdiagnose: Degeneration/Über-/Fehlbelastung;
Spondyloarthritiden;
Haglund-Exostose; Infekt;
Bursitis subachillea; Ruptur
- Therapie: Korrektur Fehlbelastung
Dehnung
Stosswelle
PRP-Infiltration
Entz. Bestrahlung
Möglichst keine Steroid-Infiltrationen

«BURSITIS TROCHANTERICA»

BESSER: «Trochanterschmerz-Syndrom»

→ Da meist keine Bursitis, sondern Myotendinosen, Enthesiopathien

- Diagnose: Anlauf-/Belastungsschmerz; Druckdolenz; Schmerz beim (nächtlichen) Draufliegen
- Differentialdiagnose: Verkalkung; atypische Femur-Fx (Bisphosphonate); Coxarthrose; Glutealmuskulaturinsuffizienz, Femurkopf-Nekrose
- Therapie: Physiotherapie (Dehnung, Kräftigung)
ev. einmal Steroidinfiltration

Hierhekipijn.nl

«PIRIFORMISSYNDROM»

Im eigentlichen Sinn: Kompression des N. ischiadicus durch M. piriformis

Meist aber „nur“ **Myotendinosen der tiefen Glutealmuskulatur**

- Diagnose: Druckdolenz/Dehnschmerz (MRI, falls Differentialdiagnose gesucht werden muss)
- Differentialdiagnose: Sakrum-Fx; Lumboradikuläre Reizung L5/S1; Sacroileitis; Hüftrotatorenläsion
- Therapie: Physiotherapie (Dehnung, Kräftigung)

DIAGNOSTISCHE MÖGLICHKEITEN

- Anamnese
- Klinik (Druckdolenz?, Dehnschmerz?, spezifische Tests?)
- Röntgen (Osteophyten/Exostosen? Kalk? Usuren? Frakturen?...)
- Sonografie (Funktionell; Muskel-/Sehnendegeneration/-risse? Tendovaginitis/Bursitis? Synovitis? Erguss? Kalk? Entzündung?...)
- MRI (wie Sonografie, plus: Knochenmarkpathologie)
- Labor (mit gezielter Fragestellung z.B. entzündliches Rheuma, Osteomalazie, Myositis...?)

THERAPEUTISCHE MÖGLICHKEITEN

- Muskelkräftigung/Dehnung/Mobilisation (Physiotherapie, Ergotherapie, Manualmedizin, Chiropraktik)
- ev. Schonen/Ruhigstellen; Kühlen/Wärmen
- Triggerpunktbehandlung (manuell, Dry-Needling)
- Neuraltherapie
- Lokale/systemische Analgesie (NSAR)
- Stosswellentherapie
- Injektionen (LA, Steroide, Hyaluronsäure, Platelet-Rich-Plasma)
- Operation

CAVE: Keine Steroide in Sehnen injizieren

LA- und Steroidinfiltrationen sind kassenpflichtig, alle anderen NICHT

Stosswellentherapie ist NICHT kassenpflichtig